

### Lista para Entregar!

A entrega deve ser feita até dia **13/04**, lembre que irei disponibilizar outra lista dia **06/04**.

Exercícios do livro do Manfredo (5<sup>a</sup> edição):  
Cap III: **05, 07 e 12**.

1. Seja  $f, g : M^n \rightarrow N^n$  isometrias entre variedades Riemannianas  $M^n, N^n$  conexas. Mostre que se existe  $p \in M^n$  tal que  $f(p) = g(p)$  e  $f_{*p} = g_{*p}$  então  $f = g$ .

2. Seja  $f : (M^n, g_1) \rightarrow (N^n, g_2)$  um difeomorfismo entre variedades Riemannianas  $M^n, N^n$  conexas que preserva distâncias, isto é,

$$d_{g_1}(p, q) = d_{g_2}(f(p), f(q))$$

para todos pontos  $p, q \in M$ . Mostre que  $f$  é uma isometria.

3. Seja  $M^2$  uma variedade Riemanniana conexa,  $j : M^2 \rightarrow M^2$  uma isometria ( $j \neq Id$ ) e  $\alpha : [0, 1] \rightarrow M^2$ , uma curva parametrizada por comprimento de arco. Mostre que se  $\alpha$  é fixada por  $j$ , isto é,  $j \circ \alpha = \alpha$  então  $\alpha$  é uma geodésica.

4. Sejam  $\phi_n : M^n \rightarrow N^n$  isometrias entre variedades Riemannianas  $M^n, N^n$  tal que  $\{\phi_n\}$  converge uniformemente, na topologia  $C^0$ , a uma função  $\phi : M^n \rightarrow N^n$ . Mostre que  $\phi$  é uma isometria.

5. Seja  $M^n$  uma variedade Riemanniana e  $f : M^n \rightarrow \mathbb{R}$  uma função suave tal que  $\nabla f$  é um campo unitário. Prove que as curvas integrais de  $\nabla f$  são curvas que minimizam globalmente a distância, isto é, para  $\alpha : (a, b) \rightarrow M$  curva integral de  $\nabla f$ , então

$$d(\alpha(t_1), \alpha(t_2)) = \text{comprimento de } \alpha|_{[t_1, t_2]}, \forall t_1, t_2 \in (a, b)$$

Conclua que toda curva integral de  $\nabla f$  é geodésica.

Obs.: Lembre que para a prova é importante que façam **TODOS** os exercícios do livro do Manfredo.